

Профилактика птичьего гриппа

Птичий грипп — быстро распространяющаяся вирусная инфекция, которая может поражать все виды пернатых.

Источник инфекции — больная и переболевшая птица, выделяющая вирус во внешнюю среду аэрогенно, со слюной, помётом, что создает возможность заражения птицы через воздух, инфицированный корм и воду. Природным резервуаром вируса птичьего гриппа чаще всего являются дикие утки, которые сами редко заболевают, а являются носителями вируса гриппа птиц и его переносчиками

При нагревании до 65⁰С вирус погибает в течение 2-5 минут. Вирус надежно обезвреживается раствором любых дезинфицирующих средств.

Заражение людей гриппом птиц происходит при тесном контакте с инфицированной птицей.

У людей отмечается тяжелое течение заболевания (лихорадка, кашель, дыхательная недостаточность из-за вирусной пневмонии).

Передача вируса от человека к человеку не подтверждена.

В целях профилактики необходимо:

- Избегать контакта с любыми птицами, их перьями, фекалиями и другими отходами.
- НЕ держать птицу как домашних любимцев.
- Мыть руки с мылом после контакта с любыми птицами.
- НЕ спать рядом с птицей.
- В случае контакта с птицей из пораженных территорий (прикосновение к телу птицы, её фекалий и т.д.) необходимо после контакта тщательно промыть руки с мылом, вынести из дома обувь и смыть с нее всю грязь.
- НЕ участвовать в транспортировке и захоронении погибшей птицы.
- НЕ участвовать в кормлении, выпасе, содержании птиц в домашних подворьях.
- НЕ купаться и не ловить рыбу в стоячих водоемах.

Оповестите родителей:

- Не рекомендуется приобретать мясо птиц, продуктов птицеводства в местах несанкционированной торговли, в т.ч. у частных лиц. Нет основания отказываться от покупок продуктов птицеводства совсем. Приобретать данную продукцию необходимо только в торговой сети с наличием ветеринарно-санитарного свидетельства.
- Необходимо мыть скорлупу яиц мыльной водой. После работы с мясом птицы, яйцом также тщательно промывать руки с мылом.

- Необходимо проводить достаточную термическую обработку мяса птицы и яйца (при прокалывании мяса не должно проступать розового сока, яйца варятся вкрутую не менее 10 минут с момента закипания).
- При наличии заболевшей птицы на домашнем подворье необходимо исполнять рекомендации санитарной службы по уничтожению птицы и проведению дезинфекции.